

|  | <b>TIPOLOGIA DI LESIONE</b> | <b>percentuale</b> |
|--|-----------------------------|--------------------|
|--|-----------------------------|--------------------|

**LESIONI APPARATO SCHELETRICO**

**CRANIO**

|   |       |
|---|-------|
| FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA | 7,00% |
| FRATTURA SFENOIDE   | 5,00% |
| FRATTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALATINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA            | 3,00% |
| FRATTURA LEFORT I° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare)                                     | 4,00% |
| FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°)   | 7,00% |
| FRATTURA ETMOIDE  | 3,00% |
| FRATTURA OSSO LACRIMALE O JOIDEO O VOMERE (non cumulabile)  | 2,00% |
| FRATTURA OSSA NASALI  | 2,50% |
| FRATTURA MANDIBOLARE(PER LATO)  | 4,00% |
| LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA   | 5,00% |
| TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE  | 8,00% |

**COLONNA VERTEBRALE**

**TRATTO CERVICALE**

|  |        |
|--|--------|
| FRATTURA CORPO III°-IV°-V°-VI°-VII°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)  | 6,00%  |
| FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)                  | 2,00%  |
| FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II°VERTEBRA   | 8,00%  |
| FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO O PROCESSI ARTICOLARI) I-VERTEBRA | 10,00% |

**TRATTO DORSALE**

|  |       |
|--|-------|
| FRATTURA DEL CORPO DALLA I°ALLA XI°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA)                              | 4,00% |
| FRATTURA DEL CORPO XII°VERTEBRA  | 8,00% |
| FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I°ALLA XII°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) | 2,00% |

**TRATTO LOMBARE**

|  |  |       |
|--|--|-------|
| FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA)   |  | 8,00% |
| FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I°ALLA V°VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) |  | 2,00% |

**OSSO SACRO**

|   |  |       |
|---|--|-------|
| FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI |  | 4,00% |
|---|--|-------|

**COCCIGE**

|  |  |       |
|--|--|-------|
| FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE |  | 4,00% |
|--|--|-------|

**BACINO**

|  |  |       |
|--|--|-------|
| FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE |  | 3,00% |
| FRATTURA ACETABOLARE(PER LATO)   |  | 6,00% |

**TORACE**

|                                  |  |        |
|----------------------------------|--|--------|
| FRATTURA CLAVICOLA(PER LATO)     |  | 4,00%  |
| FRATTURA STERNO                  |  | 2,00%  |
| FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA)  |  | 0,50%  |
| FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA) |  | 1,50%  |
| FRATTURA SCAPOLA(PER LATO)       |  | 3,00%  |
| PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA       |  | 6,00%  |
| PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA   |  | 10,00% |

**ARTO SUPERIORE (DX o Sn)**

**BRACCIO**

|   |  |       |
|---|--|-------|
| FRATTURA DIAFISARIA OMERALE   |  | 3,00% |
| FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO)                           |  | 6,00% |
| FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) |  | 6,00% |

**AVAMBRACCIO**

|  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|-------|
| FRATTURA DIAFISARIA RADIALE  |  |  |  | 2,00% |
| FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO(FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) |  |  |  | 4,00% |
| FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO(FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE)               |  |  |  | 4,00% |
| FRATTURA DIAFISARIA ULNARE   |  |  |  | 2,00% |
| FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE)              |  |  |  | 4,00% |
| FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO)                           |  |  |  | 4,00% |
| FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA   |  |  |  | 4,00% |
| FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA  |  |  |  | 5,00% |

**POLSO E MANO**

|   |  |  |  |       |
|---|--|--|--|-------|
| FRATTURA SCAFOIDE   |  |  |  | 5,00% |
| FRATTURA SEMILUNARE   |  |  |  | 3,00% |
| FRATTURA PIRAMIDALE   |  |  |  | 2,00% |
| FRATTURA PISIFORME  |  |  |  | 1,00% |
| FRATTURA TRAPEZIO   |  |  |  | 2,00% |
| FRATTURA TRAPEZOIDE   |  |  |  | 2,00% |
| FRATTURA CAPITATO   |  |  |  | 2,00% |
| FRATTURA UNCINATO   |  |  |  | 2,00% |
| FRATTURA I° METACARPALE   |  |  |  | 6,00% |
| FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE                              |  |  |  | 3,00% |
| SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente) |  |  |  | 4,00% |

**FRATTURA PRIMA FALANGE DITA**

|         |  |  |  |       |
|---------|--|--|--|-------|
| POLLICE |  |  |  | 4,00% |
| INDICE  |  |  |  | 3,00% |
| MEDIO   |  |  |  | 3,00% |
| ANULARE |  |  |  | 2,00% |
| MIGNOLO |  |  |  | 3,00% |

**FRATTURA SECONDA FALANGE DITA**

|         |  |  |  |  |       |
|---------|--|--|--|--|-------|
| POLLICE |  |  |  |  | 3,00% |
| INDICE  |  |  |  |  | 2,50% |
| MEDIO   |  |  |  |  | 2,00% |
| ANULARE |  |  |  |  | 1,00% |
| MIGNOLO |  |  |  |  | 2,00% |

**FRATTURA TERZA FALANGE DITA**

|         |  |  |  |  |       |
|---------|--|--|--|--|-------|
| INDICE  |  |  |  |  | 2,00% |
| MEDIO   |  |  |  |  | 1,00% |
| ANULARE |  |  |  |  | 1,00% |
| MIGNOLO |  |  |  |  | 2,00% |

**ARTO INFERIORE(DX o Sx)  
FRATTURA FEMORE**

|  |  |  |  |  |        |
|--|--|--|--|--|--------|
| DIAFISARIA   |  |  |  |  | 6,00%  |
| EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico)   |  |  |  |  | 10,00% |
| EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare) |  |  |  |  | 10,00% |
| FRATTURA ROTULA  |  |  |  |  | 4,00%  |

**FRATTURA TIBIA**

|   |  |  |  |  |       |
|---|--|--|--|--|-------|
| DIAFISARIA  |  |  |  |  | 3,00% |
| ESTREMITA' SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) |  |  |  |  | 5,00% |
| ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore)   |  |  |  |  | 5,00% |

**FRATTURA PERONE**

|   |  |  |  |  |       |
|---|--|--|--|--|-------|
| DIAFISARIA  |  |  |  |  | 2,00% |
| ESTREMITA' SUPERIORE(capitello o faccetta articolare tibiale) |  |  |  |  | 3,00% |

|  |       |
|--|-------|
| ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) | 4,00% |
| FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA                       | 5,00% |
| FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA                      | 6,00% |

**PIEDE**
**TARSO**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| FRATTURA ASTRAGALO  | 6,00% |
| FRATTURA CALCAGNO   | 7,00% |
| FRATTURA SCAFOIDE   | 3,00% |
| FRATTURA CUSOIDE    | 4,00% |
| FRATTURA CUNEIFORME | 1,00% |

**METATARSI**

|  |       |
|--|-------|
| FRATTURA I° METATARSALE                    | 4,00% |
| FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE | 2,00% |

**FALANGI**

|   |       |
|---|-------|
| FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange)                            | 2,50% |
| FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE | 1,00% |

**LESIONI DENTARIE**

|  |       |
|--|-------|
| ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente) | 0,70% |
| ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente) | 0,20% |
| ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente)           | 0,50% |
| ROTTURA CANINI (per ogni dente)                      | 1,00% |
| ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente)             | 0,50% |
| ROTTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente)           | 0,75% |
| ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente)                | 1,50% |
| ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente)              | 1,00% |

|                                |  |       |
|--------------------------------|--|-------|
| ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE |  | 0,25% |
| ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE |  | 0,50% |

### LESIONI PARTICOLARI

|  |  |         |
|--|--|---------|
| ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia)                     |  | 8,00%   |
| ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA   |  | 10,00%  |
| ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA   |  | 15,00%  |
| ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima)  |  | 10,00%  |
| GASTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE   |  | 40,00%  |
| RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile                                |  | 20,00%  |
| RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) --non cumulabile                             |  | 40,00%  |
| RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA'DEL RETTO -non cumulabile   |  | 15,00%  |
| COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile  |  | 40,00%  |
| AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile  |  | 60,00%  |
| COLECISTECTOMIA -non cumulabile  |  | 5,00%   |
| SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA  |  | 4,00%   |
| SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile)   |  | 6,00%   |
| EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) |  | 10,00%  |
| PORTATORE A SINTOMATICO A NTICORPO POSMVO (HIV +)  |  | 4,00%   |
| PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabile   |  | 50,00%  |
| ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente)                                |  | 3,00%   |
| ERNIA INGUINALE (trattata chirurgicamente)   |  | 5,00%   |
| LOBECTOMIA POLMONARE   |  | 15,00%  |
| PNEUMONECTOMIA   |  | 30,00%  |
| PROTESI SU AORTA TORACICA  |  | 20,00%  |
| PROTESI SU AORTA ADDOMINALE  |  | 15,00%  |
| PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE  |  | 35,00%  |
| CECITA' MONOLATERALE (Perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus)   |  | 25,00%  |
| PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI  |  | 100,00% |
| SORDITA' COMPLETA UNILATERALE  |  | 12,00%  |
| SORDITA' COMPLETA BILATERALE   |  | 50,00%  |
| PERDITA NASO (oltre i due terzi)   |  | 30,00%  |
| CORDECTOMIA  |  | 15,00%  |

|  |  |  |  |        |
|--|--|--|--|--------|
| EMILARINGECTOMIA   |  |  |  | 25,00% |
| LARINGECTOMIA  |  |  |  | 50,00% |
| PERDITA LINGUA (oltre i due terzi)   |  |  |  | 70,00% |
| PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE   |  |  |  | 8,00%  |
| PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI                                   |  |  |  | 15,00% |
| ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-)                  |  |  |  | 8,00%  |
| ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente)                      |  |  |  | 4,00%  |
| PROTESI D'ANCA (non cumulabile)  |  |  |  | 20,00% |
| PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile)  |  |  |  | 25,00% |
| PATELLECTOMIA TOTALE   |  |  |  | 10,00% |
| PATELLECTOMIA PARZIALE   |  |  |  | 4,00%  |
| PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO  |  |  |  | 5,00%  |
| PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI  |  |  |  | 25,00% |
| PERDITA ANATOMICA DEL PENE   |  |  |  | 30,00% |
| ISTERECTOMIA (non cumulabile)  |  |  |  | 20,00% |
| ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE  |  |  |  | 30,00% |
| OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE   |  |  |  | 5,00%  |
| USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (Documentate fotograficamente) |  |  |  | 30,00% |
| PTOSI PALPEBRALE   |  |  |  | 5,00%  |
| PERDITA DEL PENE   |  |  |  | 35,00% |
| IMPOSSIBILITA' ALL'EREZIONE  |  |  |  | 25,00% |
| CASTRAZIONE  |  |  |  | 25,00% |

#### LESIONI MUSCOLO-TENDINEE

|   |  |  |  |       |
|---|--|--|--|-------|
| ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile                        |  |  |  | 9,00% |
| ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)                       |  |  |  | 5,00% |
| ROTTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente)                    |  |  |  | 7,00% |
| ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito |  |  |  | 3,00% |
| ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile            |  |  |  | 6,00% |
| LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (Documentata radiologicamente)                         |  |  |  | 4,00% |
| LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente)                                     |  |  |  | 7,00% |
| LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente)   |  |  |  | 5,00% |
| LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)   |  |  |  | 3,00% |

|   |        |
|---|--------|
| LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente)   | 4,00%  |
| LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente)  | 6,00%  |
| LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente)-non cumulabile  | 5,00%  |
| LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente)-valore massimo per ogni dito    | 2,50%  |
| LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente)   | 4,00%  |
| LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente)  | 10,00% |
| LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (Documentata radiologicamente)                                       | 2,00%  |
| LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (Documentata radiologicamente)              | 1,00%  |
| LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente)  | 5,00%  |
| LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente)-non cumulabili tra loro | 8,00%  |
| LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro                        | 2,50%  |
| LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente)  | 2,50%  |
| LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro      | 6,00%  |
| LUSSAZIONE ULNOCARPICA  | 3,00%  |
| LUSSAZIONE ROTULA   | 3,00%  |
| LUSSAZIONE TIBIOCARSICA   | 3,00%  |
| LUSSAZIONE VERTEBRALE   | 5,00%  |

**AMPUTAZIONI  
ARTO SUPERIORE**

|  |        |
|--|--------|
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE      | 80,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO         | 70,00% |
| AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO | 65,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE         | 52,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO         | 58,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO       | 56,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO        | 50,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO         | 44,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO                   | 45,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE                 | 42,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO                 | 47,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE                  | 38,00% |

|   |        |
|---|--------|
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO                             | 43,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO                           | 40,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE                              | 32,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO                              | 37,00% |
| AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO                             | 30,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE                                      | 35,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO                                       | 35,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE                                     | 28,00% |
| AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO                                     | 33,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO  | 24,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE                                      | 22,00% |
| AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO                                      | 27,00% |
| AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE                                       | 18,00% |
| AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO                                       | 23,00% |
| AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO                                     | 20,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE                         | 20,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE                         | 14,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO                           | 10,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE                        | 7,00%  |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO                         | 12,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE  | 13,00% |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE  | 5,00%  |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO    | 3,50%  |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE | 2,50%  |
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO  | 4,50%  |
| AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE                  | 10,00% |
| AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO                    | 8,00%  |
| AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE                 | 6,00%  |
| AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO                  | 9,00%  |

**ARTO INFERIORE**

|  |        |
|--|--------|
| AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra dellametà della coscia) | 70,00% |
|--|--------|

|   |         |
|---|---------|
| AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra dei ginocchio) | 65,00%  |
| AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto dei ginocchio)  | 65,00%  |
| AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE   | 50,00%  |
| PERDITA DI UN PIEDE   | 45,00%  |
| PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE                             | 27,00%  |
| PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI  | 100,00% |
| PERDITA DELL'ALLUCE 6   | 6,00%   |
| PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE                                      | 3,00%   |
| PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE  | 1,00%   |

**LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO  
ARTO SUPERIORE**

|   |        |
|---|--------|
| LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE             | 60,00% |
| SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE | 45,00% |
| SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE | 45,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE           | 18,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE             | 35,00% |
| PARALISI BASSA NERVO RADIALE 25,00%         | 25,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO 40,00%      | 40,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO ULNA 25,00%         | 25,00% |
| PARALISI BASSA NERVO ULNARE 20,00%          | 20,00% |

**ARTO INFERIORE**

|  |        |
|--|--------|
| PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE 35,00%                  | 35,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE 30,00%                  | 30,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO 45,00%                  | 45,00% |
| PARALISI BASSA NERVO SCIATICO 38,00%                     | 38,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO 20,00% | 20,00% |
| PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO 22,00% | 22,00% |

**LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE**

|  |        |
|--|--------|
| EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE CON CRISI SPORADICHE 15,00%                              | 15,00% |
| EPILESSIA POST TRAUMATICA CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE CON CRISI SETTIMANALE 30,00%                              | 30,00% |
| PARAPRESI CON DEFICIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITÀ DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO 40,00%                         | 40,00% |
| MONOPRESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITÀ AI MOVIMENTI FINI DELLA MANO 40,00%               | 40,00% |
| MONOPRESI DI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO 35,00% | 35,00% |

**USTIONI  
CAPO**

|   |        |
|---|--------|
| USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO 3,00%                     | 3,00%  |
| USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO 10,00%                   | 10,00% |
| USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 16-25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO 14,00%                   | 14,00% |
| USTIONE 2' O 3' GRADO SUPERIORE AL 25 % DELLA SUPERFICIE DEL VISO 18,00%            | 18,00% |
| USTIONE 2' O 3' GRADO DEL 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO 5,00%         | 5,00%  |
| USTIONE 2' O 3' GRADO SUPERIORE AL 30 % DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO 10,00% | 10,00% |

**ARTI SUPERIORI E INFERIORI**

|  |        |
|--|--------|
| USTIONE 2' O 3' GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 5,00%         | 5,00%  |
| USTIONE 2' O 3' GRADO DI 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 10,00%        | 10,00% |
| USTIONE 2' O 3' GRADO DI 31-50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 15,00%        | 15,00% |
| USTIONE 2' O 3' GRADO DI OLTRE IL 50 % DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 20,00% | 20,00% |